

**INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN**

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá responder razonadamente a **cinco** preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se proponen.

**CALIFICACIÓN:** Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos.

**TIEMPO:** 90 minutos.

**A. 1.** (Calificación máxima: 2 puntos)

Se consideran las matrices  $A$  y  $B$  dadas por

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ b & c & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Determine los valores de los parámetros reales  $a$ ,  $b$  y  $c$  para que se verifique  $A^2 = A - B$ .  
b) Para  $a = b = c = 2$ , estudie si la matriz  $A$  es invertible y, en caso afirmativo, calcule su inversa.

**A. 2.** (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real  $f(x)$  definida por

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

- a) Obtenga los coeficientes reales  $a$ ,  $b$  y  $c$ , de  $f(x)$  sabiendo que la función tiene un extremo relativo en el punto de abscisa  $x = -3$  y que la ecuación de la recta tangente a la gráfica de  $f(x)$  en el punto de abscisa  $x = 0$  es  $y = 6x + 8$ .

- b) Para  $a = 2$ ,  $b = 1$  y  $c = 1$ , calcule la integral  $\int_1^e \frac{f(x)}{x} dx$

**A. 3.** (Calificación máxima: 2 puntos)

Dada la función

$$f(x) = x + \frac{4}{x^2}$$

- a) Halle el dominio de la función y sus asíntotas.  
b) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función y, si los hubiera, sus extremos relativos.

**A. 4.** (Calificación máxima: 2 puntos)

En un mercado agropecuario el 70 % de las verduras que se comercializan son de proximidad y el resto no. El 30 % de las verduras de proximidad son ecológicas, mientras que de las que no son de proximidad, solo son ecológicas el 10 %. Si un cliente elegido al azar ha realizado una compra de una verdura, calcule las siguientes probabilidades:

- a) Probabilidad de que la verdura comprada no sea ecológica.  
b) Probabilidad de que la verdura sea de proximidad o ecológica.

**A. 5.** (Calificación máxima: 2 puntos)

El número de kilómetros que un corredor entrena a la semana mientras prepara una carrera popular se puede aproximar por una variable aleatoria de distribución normal de media  $\mu$  horas y desviación típica  $\sigma = 10$  horas.

- a) Se toma una muestra aleatoria simple de 20 atletas, obteniéndose una media muestral de 30 kilómetros. Determine un intervalo de confianza al 95 % para  $\mu$ .  
b) Suponga que  $\mu = 28$  kilómetros. Calcule la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria simple de 10 atletas, la media muestral,  $\bar{X}$ , esté entre 28 y 30 kilómetros.

**B. 1.** (Calificación máxima: 2 puntos)

Un agricultor dispone de 5 hectáreas, como máximo, de terreno para dedicar a la plantación de trigo y cebada. Cada hectárea dedicada al trigo le supone un beneficio de 200 euros, mientras que cada hectárea dedicada a la cebada le supone un beneficio de 60 euros. Entre ambos cultivos es obligatorio plantar como mínimo una hectárea, y la normativa autonómica le obliga a que el cultivo de trigo ocupe como mucho una hectárea más que el de cebada. Represente la región factible, determine las hectáreas que debería dedicar a cada cultivo para maximizar sus beneficios y obtenga el valor del beneficio máximo.

**B. 2.** (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real  $a$ :

$$\begin{cases} x + y + z &= 2a - 1 \\ 2x + y + az &= 1 \\ x + ay + z &= 1 \end{cases}$$

- Discuta el sistema en función de los valores del parámetro  $a$ .
- Resuelva el sistema de ecuaciones para  $a = 0$ .

**B. 3.** (Calificación máxima: 2 puntos)

Se considera la función real de variable real definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax - \frac{1}{9} & \text{si } x \leq 0, \\ \frac{x+1}{x^2-9} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

- Determine el dominio de  $f(x)$  y calcule el valor del parámetro  $a \in \mathbb{R}$  para que  $f(x)$  sea derivable en todo su dominio.
- Para  $a = 0$  determine, si existen, las asíntotas de  $f(x)$ .

**B. 4.** (Calificación máxima: 2 puntos)

Sean  $C$  y  $D$  dos sucesos de un experimento aleatorio tales que  $P(C) = 0'4$ ,  $P(D) = 0'6$  y  $P(C \cup D) = 0'8$ . Calcule:

- $P(C|D)$ .
- $P(\overline{C \cap D}|C)$ .

**B. 5.** (Calificación máxima: 2 puntos)

Las calorías consumidas por un atleta durante una carrera popular se pueden aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media  $\mu$  calorías y desviación típica  $\sigma = 300$  calorías.

- Determine el tamaño mínimo que debe tener una muestra aleatoria simple para que el error máximo cometido en la estimación de  $\mu$  sea menor de 100 calorías con un nivel de confianza del 95%.
- Suponga que  $\mu = 3000$  calorías. Calcule la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria simple de tamaño  $n = 50$  atletas, la media de las calorías consumidas durante la carrera por los 50 atletas sea mayor que 2700 calorías.

**SOLUCIONES**

(Documento de trabajo Orientativo)

**Solución A. 1.**

a) La respuesta es  $a = c = -1$  y  $b = -2$ . En efecto,

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ b & c & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ b & c & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2a & 1 & 0 \\ 2b+ac & 2c & 1 \end{pmatrix} = A - B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a-1 & 1 & 0 \\ b-1 & c-1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow 2a = a - 1, 2c = c - 1, 2b + ac = b - 1 \Rightarrow a = -1 = c \text{ y } b = -2$$

b) Con  $a = c = b = 2$ , se tiene que  $|A| = 1$  y como  $A^{-1} = \frac{Adj(A^t)}{|A|}$  se sigue que

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

**Solución A. 2.**

a) En  $x = -3$  hay extremo relativo:  $f'(-3) = 0 \iff -6a + b = 0$ . La recta tangente en  $x = 0$  es:  $y = 6x + 8$ . Tanto  $f(x)$  como la recta tangente pasan por el punto de coordenadas  $(0, 8)$ . Entonces,  $c = 8$ . Además, la pendiente de la recta tangente,  $m = 6 = f'(0) = b$ . Luego, sustituyendo  $b = 6$  en la ecuación  $-6a + b = 0$ , se tiene,  $a = 1$ . Por lo que  $f(x) = x^2 + 6x + 8$ .

b)  $f(x) = 2x^2 + x + 1$ .

$$\int_1^e \frac{f(x)}{x} dx = \int_1^e (2x + 1 + \frac{1}{x}) dx = [x^2 + x + \ln x]_1^e = e^2 + e - 1$$

**Solución A. 3.**

a) El dominio es  $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{0\}$  Asíntota vertical  $x = 0$ , no hay horizontales y oblicua  $y = x$ . Todos los límites salen casi directos.

b) Puesto que  $f'(x) = 1 - \frac{8}{x^3} = 0 \iff x = 2$ , los intervalos son:

i)  $(-\infty, 0)$  y  $(2, \infty)$  la derivada es positiva y por tanto la función creciente.

ii)  $(0, 2)$  la derivada es negativa y por tanto la función decreciente. Por tanto hay un mínimo local en  $x = 2$ .

**Solución A. 4.**

Definimos los sucesos P:Proximidad, E: Ecológica.

a)

$$P(\bar{E}) = 1 - P(E) = 1 - 0'24 = 0'76$$

donde

$$P(E) = P(E|P)P(P) + P(E|\bar{P})P(\bar{P}) = 0'24$$

b)

$$P(P \cup E) = P(P) + P(E) - P(P \cap E) = 0'73$$

donde  $P(P \cap E) = P(E|P)P(P) = 0'21$

**Solución A. 5.**

a)  $IC_{95\%}(\mu) = (25'617, 34'382)$

b)  $P(28 < \bar{X} < 30) = 0'2357$

### Solución B. 1.

Sea  $x$  las hectáreas dedicadas al trigo e  $y$  las hectáreas dedicadas a la cebada. Entonces:

$$S = \{x + y \geq 1, x + y \leq 5, x - y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\},$$

con vértices  $A = (1, 0)$ ,  $B = (0, 1)$ ,  $C = (3, 2)$  y  $D = (0, 5)$ .

La función beneficio es  $B(x, y) = 200x + 60y$ . Evaluamos en los vértices de la región factible obtenidos:

- $B(1, 0) = 200$
- $B(0, 1) = 60$
- $B(3, 2) = 720 \rightarrow$  Máximo
- $B(0, 5) = 300$

El máximo beneficio se obtiene destinando 3 hectáreas al trigo y 2 a la cebada, y se obtiene un beneficio de 720 euros.

### Solución B. 2.

a)

$$|A| = \left| \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix} \right| = -a^2 + 3a - 2 = 0 \iff a = 1 \text{ o } a = 2.$$

Si  $a \neq 1, 2 \implies Rg(A) = Rg(A|B) \implies$  Sistema Compatible Determinado.

Si  $a = 1$

$$(A|B) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \implies Rg(A) = Rg(A|B) = 2 \implies$$

Compatible Indeterminado.

Si  $a = 2$ ,

$$(A|B) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right) \implies Rg(A) = 2 \neq Rg(A|B) = 3 \implies$$

Incompatible.

b) Si  $a = 0$

$$(A|B) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{f_2 - 2f_1 \\ f_3 - f_1}]{\substack{f_2 - 2f_1 \\ f_3 - f_1}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3 - f_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{array} \right)$$

Por tanto, la solución es  $2z = -1, z = -0,5, -y - 2z = 3, y = -2, x + y + z = -1, x = 1,5$ .

### Solución B. 3.

a) El dominio es  $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{3\}$ . Es continua para todo valor de  $a$  en su dominio ya que  $f(0) = \frac{-1}{9}$  y

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + ax - \frac{1}{9}) = \frac{-1}{9} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+1}{x^2-9}$$

$$\text{Como } f'(x) = \begin{cases} 2x + a & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{-x^2 - 2x - 9}{(x^2 - 9)^2} & \text{si } x > 0 \end{cases} \text{ y } \lim_{x \rightarrow 0^-} (2x + a) = a = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x^2 - 2x - 9}{(x^2 - 9)^2} = \frac{1}{-9}. \text{ Se sigue que}$$

para que  $f$  sea derivable en su dominio  $\implies a = \frac{-1}{9}$

b) Asíntota vertical  $x = 3$ .

Asíntota horizontal:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty \implies$  no tiene asíntota horizontal cuando  $x$  tiende a  $-\infty$ ;

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0, \implies$  tiene asíntota horizontal cuando  $x$  tiende a  $\infty, y = 0$

No tiene asíntotas oblicuas.

**Solución B. 4.**

$$P(C \cap D) = P(C) + P(D) - P(C \cup D) = 0'4 + 0'6 - 0'8 = 0'2$$

a)

$$P(C|D) = \frac{P(C \cap D)}{P(D)} = \frac{0'2}{0'6} = 0'33$$

b)

$$P(\overline{C \cap D}|C) = \frac{P(C) - P(C \cap D)}{P(C)} = \frac{0'4 - 0'2}{0'4} = 0'5$$

**Solución B. 5.**a) El tamaño mínimo de la muestra debe ser de  $n = 35$  atletas.b)  $P(\bar{X} > 2700) \approx 1$

## **ORIENTACIONES correspondientes a la materia: “Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II”**

Prueba de Evaluación para el Acceso a las Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado  
Curso 2020-2021

Para la elaboración de las pruebas se seguirán las características, el diseño y el contenido establecido en el currículo básico de las enseñanzas del segundo curso de bachillerato LOMCE que está publicado en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y Orden PCM/2/2021, de 11 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2020-2021.

La prueba de Evaluación de la asignatura Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II estará compuesta por diez ejercicios, a elegir cinco. Cada ejercicio, valorado con una calificación máxima de 2 puntos, corresponderá a uno de los siguientes bloques: Bloque 2 (Números y Álgebra), Bloque 3 (Análisis) y Bloque 4 (Estadística y Probabilidad). Para la evaluación del Bloque 1 (Procesos, métodos y actitudes en matemáticas), habrá problemas que tendrán un enunciado con texto.

### **1.- Álgebra.**

- Utilización de matrices como forma de representación de situaciones de contexto real.
- Transposición, suma, producto de matrices y producto de matrices por números reales.
- Concepto de inversa de una matriz. Obtención de la inversa de matrices de órdenes dos y tres.
- Determinantes de órdenes dos y tres. • Resolución de ecuaciones matriciales.
- Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas (máximo un parámetro).
- Resolución de problemas con enunciados relativos a las ciencias sociales y a la economía que pueden resolverse mediante el planteamiento de sistemas de ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas.
- Interpretación y resolución gráfica de inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas.
- Iniciación a la programación lineal bidimensional. Región factible. Solución óptima.
- Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas de contexto real con dos variables. Interpretación de la solución obtenida.

### **2.- Análisis.**

- Límite y continuidad de una función en un punto.
- Límites laterales. Ramas infinitas.

- Continuidad de funciones definidas a trozos.
- Determinación de asíntotas de funciones racionales.
- Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica.
- Relación entre continuidad y derivabilidad.
- Derivación de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. Reglas de derivación: sumas, productos y cocientes. Composición de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas.
- Aplicaciones:
  - o Cálculo de la tasa de variación instantánea, ritmo de crecimiento, coste marginal, etc.
  - o Obtención de la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto de la misma.
  - o Obtención de extremos relativos, puntos de inflexión e intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función.
  - o Resolución de problemas de optimización.
- Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades globales y locales.
- Cálculo de integrales definidas inmediatas. Regla de Barrow (Integrales definidas de funciones polinómicas, exponenciales y racionales inmediatas).
- Aplicación de la integral definida al cálculo de áreas planas.

### **3.- Probabilidad y Estadística.**

- Experimentos aleatorios. Concepto de espacio muestral y de suceso elemental.
- Operaciones con sucesos. Leyes de De Morgan.
- Definición de probabilidad. Probabilidad de la unión, intersección, diferencia de sucesos y suceso contrario o complementario.
- Regla de Laplace de asignación de probabilidades.
- Probabilidad condicionada. Teorema del Producto, Teorema de la Probabilidad Total y Teorema de Bayes.
- Concepto de población y muestra. Muestreo. Parámetros poblacionales y estadísticos muestrales.
- Distribuciones de probabilidad de las medias muestrales y de la proporción muestral. Aproximación por la distribución normal.
- Intervalo de confianza para la media de una distribución normal de desviación típica conocida. Tamaño muestral mínimo.
- Intervalo de confianza para la proporción en el caso de muestras grandes.
- Aplicación a casos reales.